

166 Canastera común



Canastera. Primavera. 2º año. Macho (29-IV).

CANASTERA COMÚN (*Glareola pratincola*)

IDENTIFICACIÓN



22-25 cm. Plumaje de tonos pardos; cabeza con garganta cremosa bordeada de una fina línea negra; alas por encima marrones, con secundarias con puntas blancas; alas por debajo con coberteras rojizas; coberteras de la cola blancas; cola muy ahorquillada; pico negro con base rojiza.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, pero **macho** con brida de color negro; **hembra** con brida de color marrón. **Macho** con diferencia entre la pluma más larga y más corta de la cola mayor de 52 mm; si la diferencia es menor pueden ser ambos sexos.



Canastera. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la brida: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con partes superiores, alas y cola con amplias puntas ante y banda subterminal oscura; cabeza y garganta con estrías marrones; horquilla de la cola más pequeña que en **adultos**.

2º año similar al **adulto**; reconocible sólo si conserva sin mudad algunas secundarias internas **juveniles**.

Adultos con partes superiores, coberteras del ala y cola de color marrón uniforme; cabeza con una delgada línea oscura alrededor de la garganta; sin contraste entre secundarias internas nuevas y viejas, aunque puede existir contraste entre las primarias debido a la suspensión de la muda en otoño; horquilla de la cola más larga que en **juveniles**.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que comienzan en las áreas de cría, para detenerse antes de la emigración y terminar en las áreas de invernada. Algunos juveniles dejan sin mudar algunas secundarias internas. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca las plumas del cuerpo adquiriendo el plumaje nupcial.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


ESTATUS EN ARAGÓN

Especie de paso con algunas citas dispersas en migración prenupcial en orillas de zonas húmedas y arrozales.



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra (29-IV).


166 Canastera común



Canastera. Primavera. Adulto. Macho ().




Canastera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (29-IV).




Canastera. Primavera. 2º año. Hembra ().



Canastera. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (29-IV); centro 2º año hembra (); abajo juvenil ().



Canastera. Primavera. Juvenil ().



166 Canastera común





Canastera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).



Canastera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().




Canastera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().



Canastera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).

Canastera. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (29-IV).


166 Canastera común




Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (29-IV).




Canastera. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (29-IV); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil ().



Canastera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias ().




Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias ().



Canastera. Primavera. Juvenil: diseño de primarias ().



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (29-IV).





Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias ().

166 Canastera común



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (29-IV).




Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias (29-IV).


Canastera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala ().



Canastera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (29-IV).



Canastera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ().



Canastera. Primavera. Juvenil: diseño de secundarias ().



Canastera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (29-IV).

166 Canastera común



Canastera. Primavera. 2º año hembra: diseño del ala ().



Canastera. Primavera. Juvenil: diseño del ala ().